



Prémisses

En garderies – CPE – garderies en milieu familial- école niveau pré-scolaire

- Les enfants ne portent pas le masque;
- Les éducatrices portent le masque en tout temps;
- Il n’y a pas de distanciation de 2m entre les enfants du même groupe;
- Il n’y a pas de distanciation de 2m entre les enfants et l’éducatrice du groupe;
- Il n’y a pas de distanciation de 2m entre les enfants et l’éducatrice remplaçante (début et fin de journée, remplacement pendant les pauses ou l’heure du repas);
- Toute personne symptomatique doit s’isoler et idéalement être testée.

LES CLASSES SPÉCIALISÉES OU À VOCATION RÉGIONALE APPLIQUENT LES MÊMES RÈGLES QUE CELLES-CI.

Gestion des personnes symptomatiques en milieu de garde et pré-scolaire

1- TRAVAILLEUR

Personne non-adéquatement vaccinée :

- Test diagnostique si disponible.
- Si test négatif ¹ : cas infirmé.²
- Si test positif ou si absence de test diagnostique :
 - **Isolement** à domicile pour **10 jours**.³
 - Levée d'isolement ensuite si critères cliniques rencontrés. ⁴
- Retour dans le milieu permis après la levée d'isolement.

Personne adéquatement vaccinée :

- Test diagnostique si disponible.
- Si test négatif ¹: cas infirmé.²
- Si test positif ou si absence de test diagnostique :
 - **Isolement** à domicile pour **5 jours**. ^{2 3}
 - Levée d'isolement ensuite si critères cliniques rencontrés. ^{4 5}
- Pendant 5 jours supplémentaires : Port du masque en tout temps lors des interactions sociales ⁶ + distanciation de 2m en tout temps si possible au travail.

¹ Un test TAAN négatif, ou deux TDAR négatifs à 24-36h d'intervalle, peuvent permettre de lever un isolement (infirmé le cas).

² Sauf en cas de détérioration clinique malgré le test négatif : la personne symptomatique devrait obtenir une consultation médicale.

³ Pour les cas ayant une **maladie sévère** (cas hospitalisés aux soins intensifs en raison de la COVID-19) et les **personnes immunosupprimées**, attendre au moins 21 jours plutôt que 10 jours. Les mêmes critères cliniques s'appliquent.

⁴ Critères cliniques de levée d'isolement pour un cas : Amélioration clinique depuis 24 heures (excluant l'anosmie, l'agueusie, la dysgueusie et la toux résiduelle qui peuvent persister) ET absence de fièvre depuis 24 heures (sans prise d'antipyrétiques). Pour les cas asymptomatiques, la durée de l'isolement est calculée à partir de la date du prélèvement du premier test positif.

⁵ Si les conditions de levée d'isolement ne sont pas remplies au jour 5, l'isolement doit durer 10 jours.

⁶ Le nombre de contacts sociaux devraient être réduits au minimum pendant cette période. Il faut éviter d'exposer des personnes vulnérables.

2- ENFANT

Personne non-adéquatement vaccinée :

- Test diagnostique si disponible.
- Si test négatif ¹ : cas infirmé.²
- Si test positif ou si absence de test diagnostique :
 - **Isolement** à domicile pour **10 jours**.³
 - Levée d'isolement ensuite si critères cliniques rencontrés.⁴
- **Retour dans le milieu permis au jour 6** (après 5 jours d'isolement sur les 10 jours d'isolement recommandés en communauté) si obtention ⁷ d'un **TDAR négatif au jour 5 ET** si les critères cliniques sont rencontrés.⁴ Sinon, pas de retour avant le jour 10.

Personne adéquatement vaccinée :

- Test diagnostique si disponible.
- Si test négatif ¹ : cas infirmé.²
- Si test positif ou si absence de test diagnostique :
 - **Isolement** à domicile pour **5 jours**.³
 - Levée d'isolement ensuite si critères cliniques rencontrés.⁴
- **Retour dans le milieu permis au jour 6** si obtention ⁷ d'un **TDAR négatif au jour 5 ET** si les critères cliniques sont rencontrés.⁴ Sinon, pas de retour avant le jour 10.

⁷ Les enfants des classes spécialisées ou à vocation régionale, peu importe l'âge des enfants, présentent des caractéristiques qui peuvent faire en sorte que l'obtention d'un TDAR ne soit pas possible à obtenir. Dans cette situation, l'obtention d'un TDAR, quoique souhaitable, pourrait être optionnelle.

Gestion des contacts asymptomatiques en milieu de garde et pré-scolaire

Pour tous les contacts asymptomatiques :

- Surveillance des symptômes pour 10 jours.
- Si développement de symptômes, voir la «Gestion des personnes symptomatiques en milieu scolaire de niveau secondaire» en page 2.

1- Contacts à risque modéré, exposés lors de la fréquentation du milieu de garde ou en communauté

- Appliquer le Guide de gestion des contacts en communauté.
- **Retour permis dans le milieu au jour 0.**
- **Pas de test de dépistage** nécessaire pour le retour dans le milieu.

2- Contacts exposés à domicile (à risque élevé) ⁸ qui fréquentent le milieu scolaire

TRAVAILLEUR ASYMPTOMATIQUE ou ENFANT ASYMPTOMATIQUE

Contact non-adéquatement vacciné :

- Appliquer le Guide de gestion des contacts en communauté.
- Après 5 jours d'isolement à domicile (sur les 10 jours d'isolement recommandés en communauté), **retour permis dans le milieu scolaire au jour 6** si asymptomatique.
- Pour le travailleur : **Pas de test de dépistage** nécessaire pour le retour dans le milieu.
- Pour l'élève : **Retour dans le milieu permis au jour 6** si obtention ⁷ d'un **TDAR négatif au jour 5**. Sinon, pas de retour avant le jour 10.
- Pendant 5 jours supplémentaires (jours 6 à 10) : Port du masque en tout temps lors des interactions sociales ⁹ pour le travailleur + distanciation de 2m si possible.

Contact adéquatement vacciné :

- Appliquer le Guide de gestion des contacts en communauté.
- Après les 5 jours d'isolement à domicile, lever l'isolement si asymptomatique.
- **Retour dans le milieu scolaire au jour 6.**
- Pour le travailleur : **Pas de test de dépistage** nécessaire pour le retour dans le milieu.
- Pour l'élève : **Retour dans le milieu permis au jour 6** si obtention ⁷ d'un **TDAR négatif au jour 5**. Sinon, pas de retour avant le jour 10.
- Pendant 5 jours supplémentaires (jours 6 à 10) : Port du masque en tout temps lors des interactions sociales ⁸ pour le travailleur + distanciation de 2m si possible.

⁸ Personne vivant sous le même toit qu'un cas de COVID-19 **OU** Partenaire intime d'un cas (p. ex. relations sexuelles; couple ne partageant pas le même domicile)

⁹ Le nombre de contacts sociaux devraient être réduits au minimum pendant cette période. Il faut éviter d'exposer des personnes vulnérables.