

Prémisses

En milieu scolaire de niveau secondaire

- Les élèves portent le masque en classe;
- Les enseignants portent le masque en tout temps lors des interactions à moins de 2m;
- Il n'y a pas de distanciation de 2m entre les élèves du même groupe;
- Il y a possibilité de distanciation de 2m entre les élèves et l'enseignant;
- Il y a possibilité de distanciation de 2m entre les élèves de groupes différents;
- Lorsqu'un cas de COVID-19 survient au niveau secondaire, les élèves qui ont porté le masque sont considérés l'avoir porté correctement.
- Toute personne symptomatique doit s'isoler et idéalement être testée.

Gestion des personnes symptomatiques en milieu scolaire de niveau secondaire

TRAVAILLEUR ou ÉLÈVE

Personne non-adéquatement vaccinée :

- Test diagnostique si disponible.
- Si test négatif ¹ : cas infirmé.²
- Si test positif ou si absence de test diagnostique :
 - **Isolement** à domicile pour **10 jours**.³
 - Levée d'isolement ensuite si critères cliniques rencontrés.⁴
- Retour dans le milieu permis après la levée d'isolement.

Personne adéquatement vaccinée :

- Test diagnostique si disponible.
- Si test négatif ¹ : cas infirmé.²
- Si test positif ou si absence de test diagnostique :
 - **Isolement** à domicile pour **5 jours**.³
 - Levée d'isolement ensuite si critères cliniques rencontrés.^{4 5}
- Retour dans le milieu permis après la levée d'isolement.
- Pendant 5 jours supplémentaires : Port du masque en tout temps lors des interactions sociales ⁶ + distanciation de 2m si possible.

¹ Un test TAAN négatif, ou deux TDAR négatifs à 24-36h d'intervalle, peuvent permettre de lever un isolement (infirmé le cas).

² Sauf en cas de détérioration clinique malgré le test négatif : la personne symptomatique devrait obtenir une consultation médicale.

³ Pour les cas ayant une **maladie sévère** (cas hospitalisés aux soins intensifs en raison de la COVID-19) et les **personnes immunosupprimées**, attendre au moins 21 jours plutôt que 10 jours. Pour la levée d'isolement, les mêmes critères cliniques s'appliquent.

⁴ Critères cliniques de levée d'isolement pour un cas : Amélioration clinique depuis 24 heures (excluant l'anosmie, l'agueusie, la dysgueusie et la toux résiduelle qui peuvent persister) ET absence de fièvre depuis 24 heures (sans prise d'antipyrétiques). Pour les cas asymptomatiques, la durée de l'isolement est calculée à partir de la date du prélèvement du premier test positif.

⁵ Si les conditions de levée d'isolement ne sont pas remplies au jour 5, l'isolement doit durer 10 jours.

⁶ Le nombre de contacts sociaux devraient être réduits au minimum pendant cette période. Il faut éviter d'exposer des personnes vulnérables.

Gestion des contacts asymptomatiques en milieu scolaire de niveau secondaire

Pour tous les contacts asymptomatiques :

- Surveillance des symptômes pour 10 jours.
- Si développement de symptômes, voir la «*Gestion des personnes symptomatiques en milieu scolaire de niveau secondaire*» en page 2.

1- **Contacts à risque modéré, exposés lors de la fréquentation du milieu scolaire ou en communauté**

- Appliquer le Guide de gestion des contacts en communauté.
- **Retour permis dans le milieu au jour 0.**
- **Pas de test de dépistage** nécessaire pour le retour dans le milieu.

2- **Contacts exposés à domicile (à risque élevé) ⁷ qui fréquentent le milieu scolaire**

TRAVAILLEUR ASYMPTOMATIQUE ou ÉLÈVE ASYMPTOMATIQUE

Contact non-adéquatement vacciné :

- Appliquer le Guide de gestion des contacts en communauté.
- Après 5 jours d'isolement à domicile (sur les 10 jours d'isolement recommandés en communauté), **retour permis dans le milieu scolaire au jour 6** si asymptomatique.
- **Pas de test de dépistage** nécessaire pour le retour dans le milieu.
- Pendant 5 jours supplémentaires (jours 6 à 10) : Port du masque en tout temps lors des interactions sociales ⁸ + distanciation de 2m en tout temps (si possible au travail).

Contact adéquatement vacciné :

- Appliquer le Guide de gestion des contacts en communauté.
- Après les 5 jours d'isolement à domicile, levée d'isolement si asymptomatique.
- **Retour dans le milieu scolaire au jour 6.**
- **Pas de test de dépistage** nécessaire pour le retour dans le milieu.
- Pendant 5 jours supplémentaires (jours 6 à 10) : Port du masque en tout temps lors des interactions sociales ⁸ + distanciation de 2m en tout temps (si possible au travail).

⁷ Personne vivant sous le même toit qu'un cas de COVID-19 **OU** Partenaire intime d'un cas (p. ex. relations sexuelles; couple ne partageant pas le même domicile)

⁸ Le nombre de contacts sociaux devraient être réduits au minimum pendant cette période. Il faut éviter d'exposer des personnes vulnérables.